

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

DLP 23-5-69 980507

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION de la STATION "AQUITAINE" (Tél. 92.06.25 et 92.26.94)

ABONNEMENT ANNUEL

GIRONDE, DORDOGNE, LOT-&GARONNE,  
LANDES, BASSES-PYRÉNÉES, CHARENTE, CHARENTE-MARITIME

Sous-Régisseur d'Avances et de Recettes, Direction Départementale de l'Agriculture  
Chemin d'Artigues, 33 - CENON

25 F.

C. C. P. : BORDEAUX 6702-46

Supplément N° 3 au Bulletin Technique N° 104 de Mai 1969

1969-14

## AVERTISSEMENTS

### VIGNE

Mildiou : Quelques taches isolées ont été découvertes la semaine dernière dans des vignes de la Gironde et du Lot et Garonne. Comme le laissait prévoir l'évolution des oeufs d'hiver, il s'agit de foyers très peu importants.

Actuellement, les risques d'invasion restent faibles, à l'exception du vignoble Charentais où les germinations sont un peu plus nombreuses.

Pour protéger la nouvelle végétation qui est devenue brusquement très rapide ces derniers jours, il serait utile de prévoir un traitement dès à présent.

Black-Rot : A la suite des pluies abondantes de la deuxième quinzaine d'avril, les premières taches, souvent nombreuses, ont été observées dans les zones où persistent des vignes incultes. Il convient donc de continuer la protection pour éviter les contaminations primaires et secondaires qui vont se chevaucher.

Tordeuses de la Grappe (Eudémis-Cochylis) : Les vols d'Eudémis et de Cochylis ont débuté dans la première décade du mois avec une intensité particulière pendant la période chaude du 10 au 16 mai.

En conséquence, appliquer dès à présent, dans les foyers habituels, un traitement insecticide soigné.

### ARBRES FRUITIERS

Tavelures des Poiriers et des Pommiers : Les projections d'Ascospores deviennent de plus en plus faibles, mais sont encore possibles, notamment sur les Pommiers.

Pour éviter de nouvelles contaminations qui peuvent encore provenir des Périthèces, mais surtout des taches qui viennent d'apparaître sur les feuilles, un nouveau traitement devrait être appliqué dès à présent.

Carpocapse des Prunes : Les premières pontes ont été déposées à partir du 10 mai et se poursuivent actuellement chaque soir quand la température crépusculaire est suffisante (plus de 13°).

Il est recommandé d'appliquer dès réception du présent bulletin un traitement insecticide destiné à empêcher la pénétration dans les Prunes des jeunes chenilles dont l'éclosion devrait débuter aux environs du 25 mai. Choisir un des insecticides conseillés pour la lutte contre le Carpocapse des Pommiers.

.../...

P 341

.../...

INFORMATIONS

Bactériose du Noyer : L'abaissement des températures a ralenti la Végétation et prolongé la période de floraison des Noyers.

Pour assurer la protection des pousses fructifères pendant cette période sensible, une nouvelle application est nécessaire dans les vergers où la floraison a débuté depuis une semaine.

Cochenille du Mûrier au Pêcher : Il est encore trop tôt pour intervenir, les éclosions des jeunes larves débutant à peine. Attendre un avis ultérieur.

Bordeaux, le 21 Mai 1969

Le Contrôleur  
chargé des Avertissements  
C. ROUSSEL

L'Inspecteur  
de la Protection des Végétaux  
J. BRUNETEAU